

© A.B. Бадеев

Россия, Улан-Удэ, Бурятский государственный университет

Топологический ранг многообразия n_3n_2 коммутативных альтернативных ниль-алгебр индекса 3 над полем характеристики 3

В статье доказана теорема о топологическом ранге многообразия n_3n_2 коммутативных альтернативных ниль-алгебр индекса 3 над полем характеристики 3.

© A.V. Badeev

Topological rank of manifold n_3n_2 of commutative alternative nil-algebras with index 3 under the field with characteristic 3

The theorem on topological rank of manifold n_3n_2 of commutative alternative nil-algebras with index 3 under the field with characteristic 3 is proved in the article.

Положим, D – многообразие коммутативных альтернативных ниль-алгебр индекса 3 над полем Φ характеристики 3 с тождествами

$$x^3 = 0,$$

$$[(x_1x_2)(x_3x_4)](x_5x_6) = 0.$$

В работе приведен базис пространства полилинейных многочленов свободной алгебры $F(D)$ и найден топологический ранг $r_t(D_n)$ многообразий

$$D_n = D \cap \text{Var}((xy \cdot zt)x_1 \dots x_n).$$

Вспомогательная алгебра

Построение вспомогательной алгебры A проведем с помощью конечномерной супералгебры B .

Положим,

$$E_0 = \{ a, a^2 \}, E_1 = \{ x, ax, a^2x \},$$

$$E = E_0 \cup E_1, B = \Phi(E_0) + \Phi(E_1).$$

Назовем четными элементы пространства $\Phi(E_0)$, нечетными – элементы пространства $\Phi(E_1)$.

Положим, что умножение суперкоммутативно, т.е. выполняется супертождество

$$x_i \cdot y_j = (-1)^{\bar{y}_j} y_j \cdot x_i,$$

где $x_i, y_j \in E_i$.

Определим суперкоммутативное умножение на базисных элементах следующим образом:

$$\begin{aligned} a \cdot a &= a^2, \\ a \cdot x &= ax, a^2 \cdot x = ax \cdot a = a^2x, \\ ax \cdot x &= a, a^2x \cdot x = -a^2. \end{aligned}$$

Остальные произведения полагаем нулевыми.

Легко видеть, что

$$\begin{aligned} B \setminus B^2 &= \Phi\{x\}, B^2 \setminus B^{(2)} = \Phi\{a, ax\}, \\ B^{(2)} &= \Phi\{a^2, a^2x\}, (B^2)^3 = 0. \end{aligned}$$

Покажем, что в супералгебре B выполняется супертождество

$$(z \cdot x_i)y_j + (-1)^{\bar{y}_j}(z \cdot y_j)x_i + z \cdot (x_i \cdot y_j) = 0,$$

где $x_i, y_j \in E_i$. Это супертождество соответствует линеаризованному тождеству альтернативности.

Достаточно проверить это супертождество на базисных элементах, причем в силу суперкоммутативности при проверке порядок подстановки базисных элементов вместо переменных в супертождестве не имеет значения. Как легко заметить, для $x_i = y_j = x, ax \in E_1$ супертождество тривиально. Таким образом, учитывая соотношение $(B^2)^3 = 0$, остается проверить супертождество для следующих троек базисных элементов:

$$\{a, a, x\}, \{ax, a, x\}.$$

В первом случае получим

$$(a \cdot a) \cdot x + (a \cdot x) \cdot a + a \cdot (a \cdot x) = 3a^2x = 0.$$

Во втором случае

$$\begin{aligned} (ax \cdot a) \cdot x + (ax \cdot x) \cdot a + ax \cdot (a \cdot x) &= \\ &= -a^2 + a^2 = 0. \end{aligned}$$

Супертождество проверено. Таким образом, B – альтернативная супералгебра.

Теперь можем заключить, что гравитанская оболочка $A = G(B)$ – коммута-

тивная альтернативная алгебра с соотношениями $x^3 = 0$, $(A^2)^3 = 0$, т.е.

$$A \in D, A \notin D_n, c^3 d \neq 0.$$

Центрально-метабелево многообразие

Лемма 1.

1. Базис пространства $P_n(F^{(2)}(C))$ при $n = 4t$ или $n = 4t + 3$ составляют полилинейные одночлены вида:

$$a) x_i x_j \varphi_{i,j} (x_2 x_j), \quad 2 < i < j;$$

$$b) x_i x_j \varphi_{i,3} (x_2 x_3), \quad i > 3.$$

2. При $n = 4t + 1$ или $n = 4t + 2$ базис пространства $P_n(F^{(2)}(C))$ составляют элементы типа а) и б) и полилинейный одночлен:

$$c) x_1 x_5 \varphi_{5,4} (x_2 x_4).$$

Базис свободной алгебры $F(D)$

Построим базис каждого из пространств $P(F_p^{(2)}/F_{p+1}^{(2)})$. Ясно, что $F_0^{(2)}/F_1^{(2)} = F^{(2)}(C)$, где $C \subseteq D$ многообразие центрально-метабелевых алгебр.

Положим, H_n – система базисных элементов пространства $P_n(F_0^{(2)}/F_1^{(2)})$.

Обозначим, $\xi_{n,p} = x_{n-p+1}' \dots x_n'$ – операторное слово длины p .

$$e_n = x_1 x_5 \varphi_{5,4} \cdot x_2 x_4 \in H_n,$$

$$e_{n,p} = e_{n-p} \xi_{n,p},$$

$$H_n' = \{ x_1 x_4 \varphi_{4,j} \cdot x_2 x_j \in H_n \}.$$

Действие перестановок симметрической группы на пространстве многочленов длины n определим стандартным образом.

Лемма 2. Базис пространства $P_n(F_p^{(2)}/F_{p+1}^{(2)})$, где $1 \leq p \leq n - 4$, составляют элементы следующей системы (обозначим эту систему $E_{n,p}$):

$$1) H_{n,p} = \{ b \xi_{n,p} \mid b \in H_{n-p} \};$$

$$2) H_{n,p}'(1k) = \{ b (1k) \mid b \in H_{n,p}' \},$$

где $k = n-p+1$;

$$3) e_{n,p} (1i)(2j) \text{ для всех } i, j \in \{1, 2\} \cup Z_{n,p}, \\ i < j, \{i, j\} \neq \{1, 2\}.$$

Найдем топологический ранг многообразий D_n . Для этого понадобятся следующие утверждения.

Лемма 3. Пусть M – шпехтово много-

образие, $V \subset W \subset \beta(M)$ и для любого $\Omega \subset W$ существует n такое, что $U_n(\Omega) \subset W$.

Тогда

$$r_t(W) \leq r_t(V) + 1.$$

Лемма 4. Пусть $f_t \in F_t^{(2)}/F_{t+1}^{(2)}$ – ненулевой многочлен длины r , тогда существует полилинейный многочлен $g_t \in F_t^{(2)}/F_{t+1}^{(2)}$ той же длины, такой, что

$$T(f_t)/F_{t+1}^{(2)} = T(g_t)/F_{t+1}^{(2)}.$$

$$T(f_t) = T(f_t' \psi_t) = T(e_{m-t,0} \xi_{m,t}) = T(e_{m,t}).$$

Лемма 5. Для любого $M \in \Delta_p$ существует s такое, что

$$a) \text{ для } p = 0 \quad U_s(M) \subseteq \text{Nilp};$$

$$b) \text{ для } p \neq 0 \quad U_s(M) \subseteq \Delta_{p-1}.$$

Теорема. Топологический ранг $r_t(D_n) = n+2$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Nilp} \subset \Delta_0 \subset \Delta_1 \subset \dots \subset \Delta_{n-1} \subset \Delta_n = D_n$.

Из леммы 3 и леммы 5

$$r_t(\Delta_0) \leq r_t(\text{Nilp}) + 1,$$

$$r_t(\Delta_p) \leq r_t(\Delta_{p-1}) + 1 \text{ для } 1 \leq p \leq n.$$

Отсюда

$$r_t(D_n) \leq n+2.$$

Осталось показать, что

$$r_t(D_n) \geq n+2.$$

Положим, \sum_p – множество всех подмногообразий D_p . Пример вспомогательной алгебры $A \in D$, в которой $e_{m,k} \notin T(A)$ показывает, что $D_p \in (\sum_p \setminus \sum_{p-1})'$. Следовательно,

$$\begin{aligned} r_t(D_n) &= r_t(\sum_n) > r_t(\sum_{n-1}) > \dots > r_t(\sum_2) > \\ &> r_t(C) > r_t(B) \geq 2, \end{aligned}$$

где $C \subseteq D$ – центрально-метабелево многообразие. Тогда $r_t(D_n) \geq n+2$.

Литература

- Жевлаков К.А., Слинько К.А., Шестаков И.П., Ширшов А.И. Кольца, близкие к ассоциативным. – М.: Наука, 1978.
- Пчелинцев С.В. Разрешимые индексы 2 многообразия алгебр // Матем. сб. – 1981. – Т. 115, – С. 179–203.
- Шестаков И.П. Супералгебры и контрприимеры // Сибирский математический журнал. – 1991. – Т. 32, № 6.